

## 造影CT検査オーダー時のビグアナイド系糖尿病薬チェック（薬剤一覧表）

### ◎ビグアナイド系薬剤の添付文書より（重要な基本的注意の項）


ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時には、患者の状態に注意すること。

### ◎記載例

| 商品名 | 写真    |
|-----|-------|
|     | 識別コード |

**後** 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

**後除** 診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品

| ブホルミン                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>後</b> ジベトス錠50mg                                                                               | <br>NN 113                                                   | <b>後</b> ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」                                                                    | <br>白色の腸溶性フィルムコート錠                                           |
| メトホルミン                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| グリコラン錠250mg                                                                                      | <br>302                                                      | 院外専用採用薬<br>メトグルコ錠（250mg,500mg）                                                                  | <br>250mg錠：DS271 / 250<br>500mg錠：DS272 / 500                 |
| <b>後</b> メトホルミン塩酸塩錠「トーワ」250mg                                                                    | <br>Tw720                                                    | <b>後</b> メトホルミン塩酸塩錠「SN」250mg                                                                    | <br>ME                                                       |
| 院内採用薬<br>メトホルミン塩酸塩錠MT「DSPB」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                | <br>250mg錠：DS271 / 250<br>500mg錠：DS272 / 500                 | メトホルミン塩酸塩錠MT「JG」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                          | <br>250mg錠：メトホルミンMT250G / JG F26<br>500mg錠：メトホルミンMT500G      |
| メトホルミン塩酸塩錠MT「TCK」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                          | <br>250mg錠：TU334 / 250<br>500mg錠：TU335 / 500                | メトホルミン塩酸塩錠MT「トーワ」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                         | <br>250mg錠：TwM1 / トーワ250<br>500mg錠：メトホルミン500 / トーワ500       |
| メトホルミン塩酸塩錠MT「DSEP」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                         | <br>250mg錠：メトホルミン DSEP 250 MT<br>500mg錠：メトホルミン DSEP 500 MT | メトホルミン塩酸塩錠MT「TE」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                          | <br>250mg錠：TEF1 / 250<br>500mg錠：TEF2 / 500                 |
| メトホルミン塩酸塩錠MT「三和」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                           | <br>250mg錠：Sc 31 / 250<br>500mg錠：Sc 32 / 500               | メトホルミン塩酸塩錠MT「日医工」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                         | <br>250mg錠：n 758 / メトホルミン 250<br>500mg錠：n 759 / メトホルミン 500 |
| メトホルミン塩酸塩錠MT「ニプロ」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                          | <br>250mg錠：メトホルミン MT250 ニプロ<br>500mg錠：メトホルミン MT500 ニプロ     | メトホルミン塩酸塩錠MT「VTRS」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）<br>*ヒート写真・刻印はファイザーと同じです                | <br>250mg錠：YA 250<br>500mg錠：YA 500                         |
| メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」<br>（ <b>後除</b> 250mg、 <b>後</b> 500mg）                                           | <br>250mg錠：MeP10<br>500mg錠：MeP11                           | メトホルミン塩酸塩錠MT「SN」<br>（250mg） <b>後</b>                                                            | <br>250mg錠：ME                                              |
| 配合剤                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 院外専用採用薬<br>メタクト配合錠<br>（LD、HD）<br>（LD：メトホルミン500mg+ピオグリタゾン15mg）<br>（HD：メトホルミン500mg+ピオグリタゾン30mg）    | <br>LD：321 / 15/500<br>HD：322 / 30/500                     | 院外専用採用薬<br>メトアナ配合錠<br>（LD、HD）<br>（LD：メトホルミン250mg+アナグリプチン100mg）<br>（HD：メトホルミン500mg+アナグリプチン100mg） | <br>LD：Sc125 / LD<br>HD：Sc150 / HD                         |
| 院外専用採用薬<br>エクメット配合錠<br>（LD、HD）<br>（LD：メトホルミン250mg+ビルダグリブチン50mg）<br>（HD：メトホルミン500mg+ビルダグリブチン50mg） | <br>LD：NVR / CCC<br>HD：NVR / LLO                           | 院外専用採用薬<br>イニシンク配合錠<br>（メトホルミン500mg+アログリプチン25mg）                                                | <br>317 / 25/500                                           |