

## 抗血栓薬の休薬指針

表1

### 手術 および 検査の出血リスク

出血リスク	低リスク	中リスク	高リスク
抗血栓薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続（休薬不要）</li> <li>・中止する場合は当日のみ休薬とし、術直後より再開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・減量もしくは中止</li> <li>・アスピリンは継続（休薬不要）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続は不可（中止）</li> <li>・抗血栓薬の中止が可能となるまで手術を延期</li> </ul>
手術	<ul style="list-style-type: none"> <li>・眼科手術</li> <li>・四肢バイパス手術</li> <li>・脳室ドレナージ</li> <li>・表在性局麻手術</li> <li>・経尿道的尿管ステント挿入術</li> <li>・四肢骨接合術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開胸術</li> <li>・冠動脈バイパス術</li> <li>・開腹術</li> <li>・鏡視下手術</li> <li>・頸部手術</li> <li>・人工骨頭および人工関節置換術</li> <li>・頭蓋内手術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開心術</li> <li>・脊椎手術</li> <li>・骨盤手術</li> <li>・経尿道的手術</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表在性生検</li> <li>・骨髓穿刺術、骨髓生検、髄腔内注入術（血液内科）</li> <li>・甲状腺針穿刺吸引細胞診（ABC）</li> <li>・腹水および胸水穿刺ドレナージ術</li> <li>・中心静脈穿刺術</li> <li>・末梢動脈穿刺及び圧モニター</li> <li>・抜歯、インプラント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経皮的胆嚢/胆管ドレナージ術（PTGBD/PTCD）</li> <li>・経皮的肝生検</li> <li>・経皮的肝エタノール注入術（PEIT）およびラジオ波焼灼術（RFA）</li> <li>・腹部血管造影、肝動脈化学塞栓療法（TACE）*</li> <li>・副腎静脈サンプリング*</li> <li>・CV-ポート留置術*</li> <li>・CTガイド下膿瘍ドレナージ術*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腰椎穿刺術、髄腔内注入術</li> <li>・経皮的腎生検術</li> <li>・気管支内視鏡下生検（TBLB）、ブラッシング細胞診</li> <li>・CTガイド下肺針生検</li> <li>・臍針生検</li> <li>・筋生検・神経生検</li> <li>・CTガイド下腫瘍生検*</li> <li>・バルーン閉塞下逆行性経静脈的静脈瘤塞栓術（BRTO）*</li> </ul>

\* CTガイド下生検をはじめ、IVRの手法に関しては、使用する生検針のサイズや症例の病態・患者の状況によりリスクがそれぞれ異なるので、症例ごとに詳細をIVR施行医に問い合わせ、主治医と協議して頂く

※内視鏡については、

「消化器内視鏡検査・治療時の抗血栓薬（抗凝固薬・抗血小板薬）の取り扱い」2017年2月 を参照