


抗血栓薬の手術前休薬期間

【2021年11月改訂】

薬効	医薬品名			休薬期間												
	一般名	薬品名（一例）	写真（一例）													
抗凝固薬	ワルファリン	ワーファリン など		3-5日間 ^{*1}												
	ダビガトラン	ブラザキサカプセル など		<table><tr><td>C C r</td><td>出血リスク「低」 出血コントロール可能</td><td>出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ</td></tr><tr><td>80m L /分以上</td><td>24時間以上</td><td>48時間以上</td></tr><tr><td>50～79m L /分</td><td>36時間以上</td><td>72時間以上</td></tr><tr><td>30～49m L /分</td><td>48時間以上</td><td>96時間以上</td></tr></table>	C C r	出血リスク「低」 出血コントロール可能	出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ	80m L /分以上	24時間以上	48時間以上	50～79m L /分	36時間以上	72時間以上	30～49m L /分	48時間以上	96時間以上
	C C r	出血リスク「低」 出血コントロール可能	出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ													
	80m L /分以上	24時間以上	48時間以上													
	50～79m L /分	36時間以上	72時間以上													
	30～49m L /分	48時間以上	96時間以上													
リバーロキサパン	イグザレルト など		<table><tr><td>C C r</td><td>出血リスク「低」 出血コントロール可能</td><td>出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ</td></tr><tr><td>30m L /分以上</td><td>24時間以上</td><td rowspan="2">48時間以上</td></tr><tr><td>15～29mL /分</td><td>36時間以上</td></tr></table>	C C r	出血リスク「低」 出血コントロール可能	出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ	30m L /分以上	24時間以上	48時間以上	15～29mL /分	36時間以上					
C C r	出血リスク「低」 出血コントロール可能	出血リスク「中～高」 重篤な出血の恐れ														
30m L /分以上	24時間以上	48時間以上														
15～29mL /分	36時間以上															
アピキサパン	エリキュース錠 など		48時間以上													
エドキサパン	リクシアナ など															
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン コンブラピン配合錠 タケルダ配合錠 キャブリン配合錠 パファリン配合錠A81 など		7-10日間 ^{*3,5}												
	チクロピジン	パナルジン チクロピジン など		7-10日間 ^{*3,5}												
	クロピドグレル	プラビックス錠 クロピドグレル錠 コンブラピン配合錠 ロレアス配合錠 など		5-7日間 ^{*4,5}												
	プラスグレル	エフィエント など		7 ^{*5} -14日間 ^{*2}												
	チカグレロル （ASAと併用）	プリリント錠 など		5日間 ^{*2}												
	シロスタゾール	プレタール シロスタゾール など		3日間 ^{*5}												
	サルボグレラート	アンブラーグ サルボグレラート塩酸塩錠 など		24時間 ^{*6}												
	ジピリダモール	ベルサンチン錠 ジピリダモール など		24時間 ^{*6}												
	イコサバント酸 エチル	エパデール イコサバント酸エチル など		7日間 ^{*3}												
	ω-3脂肪酸エチル	ロトリガ など		7日間 ^{*6}												
	ニセリトロール	ペリシット錠 など		24時間 ^{*6}												
	リマプロスト アルファデクス	オバルモン錠 プロレナール錠 リマプロストアルファデクス錠 など		24時間 ^{*6}												
	ベラプロスト	ベラプロストNa錠 プロサイリン錠 ドルナー錠 ケアロードLA錠 ベラサスLA錠 など		24時間 ^{*6}												
脳循環・代謝賦活薬	イフェンプロシル	セロクラール など		24時間 ^{*6}												
	イブジラスト	ケタス など		3日間 ^{*6}												
	ニセルゴリン	サアミオン ニセルゴリン錠 など		2日間 ^{*6}												
冠血管拡張薬	ジラゼブ	コメリアンコーワ錠 など		24時間 ^{*6}												
	トラビシル	ロコルナール トラビシル錠 など		2日間 ^{*6}												

*1 不整脈治療ガイドライン（2020年改訂版）

*2 添付文書、インタビューフォーム、適正使用ガイド参照

*3 日本手術医学会：手術医療の実践ガイドライン

*4 非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン（2014年改訂版）

*5 冠動脈疾患患者における抗血栓療法ガイドライン（2020年フォーカスアップデート版）

*6 半減期、持続時間、類似薬など考慮にて記載