

OC・LEPガイドライン2015年度版：45分を超える手術では、手術の少なくとも4週間前から中止する。術後、不動状態が解除されるまでは再開を避ける。

ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版：手術のリスクによって 4～6 週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。

薬効分類	成分名	商品名	休薬推奨期間	術後再開の目安	備考
低用量OC	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	アンジュ21錠/28錠	4週間	2週間	添付文書上、術前4週間、術後2週間は血栓リスクがあるため、禁忌とされている。
		トリキュラー錠21/28			
		ラベルフィーユ21錠/28錠			
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	シンフェーズT28			
		マーベロン21/28			
	デノゲストレル・エチニルエストラジオール	ファボワール錠21/28			
（製剤） 卵巣機能抑制剤 黄体ホルモン拮抗剤	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ヤーズ配合錠			添付文書には術前休業に関する記載はないが、「術前または長期臥床状態の患者は血液凝固能が亢進され、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある」と記載されている。 日本産科婦人科学会が発出しているホルモン補充療法ガイドライン2017では、「手術のリスクによって4-6週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。」と記載されている。
		ヤーズフレックス配合錠			
		ドロエチ配合錠			
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠LD・ULD			
		フリウェル配合錠LD・ULD			
	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	ジェミーナ配合錠			
（製剤） 卵巣機能抑制剤 黄体ホルモン拮抗剤	エチニルエストラジオール・ノルゲストレル	プラノバール配合錠	4-6週間	2週間	添付文書には「手術前4週以内又は長期臥床状態の患者」と記載されている。 日本産科婦人科学会が発出しているホルモン補充療法ガイドライン2017では、「手術のリスクによって4-6週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。」と記載されている。
	エストラジオール1mg・レボノルゲストレル0.04mg	ウェールナラ配合錠			
	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	メノエイドコンビパッチ			
	エストラジオール0.5mg	ジュリナ錠0.5mg			
	エストラジオール	エストラーナテープ 0.09mg,0.18mg,0.36mg,0.72mg			
	エストラジオール1mg・レボノルゲストレル0.04mg	ディビゲル1mg			
	エストラジオール0.54mg/1ブッシュ（0.9g）	ル・エストロジェル0.06%			
	エストラジオール吉草酸エステル	プロギノン・デポー筋注10mg			
	エストリオール0.1mg,0.5mg,1mg	エストリール錠100γ.0.5mg・1mg			
	エストリオール1mg	エストリオール錠1mg「F」			
	エストリオール1mg	ホーリン錠1mg			
	結合型エストロゲン0.625mg	プレマリン錠0.625mg	4週間		添付文書には「手術前4週以内又は長期臥床状態の患者」と記載されている。 日本産科婦人科学会が発出しているホルモン補充療法ガイドライン2017では、「手術のリスクによって4-6週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。」と記載されている。
	エストリオール0.5mg	エストリール膣錠0.5mg	無		
	エストリオール1mg	ホーリンV膣錠用1mg	無		

OC・LEPガイドライン2015年度版：45分を超える手術では、手術の少なくとも4週間前から中止する。術後、不動状態が解除されるまでは再開を避ける。

ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版：手術のリスクによって 4～6 週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。

薬効分類	成分名	商品名	休薬推奨期間	術後再開の目安	備考
黄体ホルモン製剤	クロルマジノン酢酸エステル2mg	ルトラール錠2mg	無		
	ジドロゲステロン 5mg	デュファストン錠5mg	無		
	プロゲステロン200mg	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	無		
	プロゲステロン	エフメノカプセル100mg	無		
	プロゲステロン	プロゲステロン筋注25mg「F」・50mg「F」	無		
	プロゲステロン100mg	ルティナス腔錠100mg	無		
	プロゲステロン400mg	ルテウム腔用坐剤400mg	無		
	プロゲステロン90mg	ワンクリノン腔用ゲル90mg	無		
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロン錠5mg	4週間		国内における術前休薬基準の記載はなし。添付文書の副作用項目には、血栓塞栓症の記載あり、製薬メーカーは術前4週間休薬を推奨しており、さらに、術前に凝固線溶系パラメーターに異常がないことを確認することを推奨している。
		プロベラ錠2.5mg			国内における術前休薬基準の記載はなし。添付文書の副作用項目には、血栓塞栓症の記載あり。当医薬品メーカーは休薬に関するデータはないが、同一成分のヒスロン錠、ヒスロンH錠の医薬品メーカーによると、術前4週間休薬を推奨しており、さらに、術前に凝固線溶系パラメーターに異常がないことを確認することを推奨している。
		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg,5mg			
黄体悪性腫瘍製剤	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH錠200mg	4週間	術後1週間【禁忌】 術後1か月【慎重投与】	国内における術前休薬基準の記載はなし。添付文書の副作用項目には、血栓塞栓症の記載あり、製薬メーカーは術前4週間休薬を推奨しており、さらに、術前に凝固線溶系パラメーターに異常がないことを確認することを推奨している。
		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」			
前立腺癌治療剤	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物156.7mg	エストラサイトカプセル156.7mg	4日間		国内における休薬基準の記載はなし。添付文書の副作用項目には、血栓塞栓症の記載あり、血栓ができるリスクに応じて休薬を判断することを推奨。製薬メーカー確認し、休薬する際の休薬期間については、4日間が推奨。
卵巣製剤	エチニルエストラジオール0.5mg	プロセキソール錠0.5mg	4週間	2週間	国内における休薬基準の記載はなし。添付文書の副作用項目には、血栓塞栓症の記載あり、血栓ができるリスクに応じて休薬を判断することを推奨。製薬メーカー確認し、休薬する際の休薬期間については、4週間が推奨。
子宮内療薬膜	ジェノゲスト	ディナゲスト錠0.5mg,1mg,同OD1mg	無		
		ジェノゲスト錠1mg,OD1mg	無		
	ダナゾール	ボンゾール錠100mg,200mg	無		
女性・男性合剤ホルモン配	テストステロンエナント酸エステル90.2mg・エストラジオール吉草酸エステル4mg	プリモジアン・デポー筋注	4-6週間	2週間	添付文書には術前休薬に関する記載はないが、「術前または長期臥床状態の患者は血液凝固能が亢進され、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある」と記載されている。 日本産科婦人科学会が発出しているホルモン補充療法ガイドライン2017では、「手術のリスクによって4-6週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。」と記載されている。

OC・LEPガイドライン2015年度版：45分を超える手術では、手術の少なくとも4週間前から中止する。術後、不動状態が解除されるまでは再開を避ける。

ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版：手術のリスクによって 4 ～ 6 週間前から、術後2週間または完全に歩行ができるまで中止する。

薬効分類	成分名	商品名	休薬推奨期間	術後再開の目安	備考
薬 避 緊 妊 急	ノボノルゲストレル1.5mg	ノルレボ錠1.5mg	無		
ス 放 ル 黄 子 テ 出 モ 体 密 ム シ ン ホ 西	1 システム中ノボノルゲストレル52mg含有	ミレーナ52mg	無		
排 卵 薬 誘	クロミフェンクエン酸塩	クロミッド50mg	無		
	シクロフェニル	セキソビット錠100mg	無		
性 腺 刺 激 ホ ル モ ン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルミン	フォリルモンP注75,150	無		
	ヒト下垂体性性腺刺激ホルミン	HMG注射用75IU、150IU「フェリング」	無		
	ヒト下垂体性性腺刺激ホルミン	uFSH注用 7 5 単位 1 5 0 単位「あすか」	無		
	ヒト絨毛性性腺刺激ホルミン（注射用HCG）	ゴナトロピン注用5000単位 筋注用1000,3000単位i	無		
	ヒト絨毛性性腺刺激ホルミン（注射用HCG）	HCGモチダ筋注用33000単位、5000単位、10000単位	無		
	ヒト絨毛性性腺刺激ホルミン（注射用HCG）	注射用HCG3000単位、5000単位、10000単位	無		
	ホリトロピンアルファ	ゴナールエフ皮下注ベン300、450、900	無		
	ホリトロピンアルファ	ゴナールエフ皮下注用75、150	無		
	コリオゴナドトロピンアルファ	オビドレル皮下注シリンジ250μg	無		
G n R H ア ゴ ニ ス ト	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス1.8mgデポ	無		
	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス3.6mg、LA10.8mgデポ	無		
	ナファレリン酢酸塩	ナサニール点鼻液0.2%	無		
	ナファレリン酢酸塩	ナファレリン点鼻液0.2%[F]	無		
	ブセレリン酢酸塩	スプレキュア点鼻液0.15%	無		
	ブセレリン酢酸塩	ブセレリン点鼻液0.15%[F]	無		
	リュープロレリン酢酸塩	リュープリン注射用1.88mg、3.75mg、リュープリン注射用キット1.88mg、3.75mg	無		
	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンSR注射用キット11.25mg、リュープリンPRO注射用キット22.5mg	無		
	リュープロレリン酢酸塩	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg、3.75mg	無		
ン G タ n ト G R ニ H ス ア	ガニレリクス酢酸塩	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	無		
	セトロレリクス酢酸塩	セトロタイド注射用0.25mg	無		
	レルゴリクス	レルミナ錠40mg	無		