

CPT11 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

CPT11 療法

週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

		day1	-	-	day8	-	-	day15
イリノテカン	100mg/m ²	↓			↓			↓

- 【注意】 * 必要時 化学療法開始前日から半夏瀉心湯 7.5g 3×毎食前 内服開始
 または 重曹 1.8g 3×毎食後 内服4日間
 * イリノテカン使用前に腹痛・下痢がないことを確認する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1,8,15

- ① 生食 500mL で血管確保 維持 (20mL/時間)
 - ② グラニセトロン注 3mg 1筒 側管静注
(生食 100mL 点滴静注 30分 (200mL/時間)でも可)
 - ③ デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL)+ 生食 20mL 側管静注
 - ④ イリノテカン + 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注 90分 (180mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

Day 2,3 , 9,10 , 16,17

デキサメタゾン錠 8mg /日 内服

	コース			コース		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
月日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

CPT11 療法

	コース			コース		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
月日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
月日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						