

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM+CBDCA 療法

3 週毎 4~6 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌(non-small cell ca.)

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓	

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125mg) 1C を内服

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン 4.95 mg (1.5 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ ゲムシタビン + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注 60 分(280 mL/時間) |

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2, 3 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 1×朝 内服

Day 2-4 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

Day8

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ ゲムシタビン + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

GEM+CBDCA 療法

	コース		コース		コース	
	Day1	Day8	Day1	Day8	Day1	Day8
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓		↓		↓	
確認						

	コース		コース		コース	
	Day1	Day8	Day1	Day8	Day1	Day8
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓		↓		↓	
確認						