

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PTX weekly + CBDCA療法

4週毎 4 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	day15
パクリタキセル	90 mg/m ²	↓	↓	↓
カルボプラチン	AUC 6	↓		

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること

* アルコール過敏 有・無

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | | 維持(20 mL/時間) |
| ② レスタミン錠10 mg 5錠 | | 内服 |
| ③ ファモチジン 20 mg | + デキサメタゾン 6.6 mg | 側管静注 |
| ④ アロカリス 235 mg | + パロノセトロン 0.75 mg | + 生食 100 mL |
| | | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ⑤ パクリタキセル | + 生食 500 mL | 点滴静注90分(360 mL/時間) |
| ⑥ カルボプラチン | + 5%ブドウ糖 250 mL | 点滴静注60分(280 mL/時間) |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2-3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

福岡大学化学療法プロトコール審査委員会承認 (2006年11月17日) A0114

2024年8月16日改訂

Day 8, 15

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② レスタミン錠10 mg 5錠 内服

③ ファモチジン 20 mg + デキサメタゾン 6.6 mg 側管静注

☆30分間隔をあける

④ パクリタキセル + 生食 500 mL 点滴静注90分(360 mL/時間)

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	Day 1	Day 8	Day 15	Day 1	Day 8	Day 15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	Day 1	Day 8	Day 15	Day 1	Day 8	Day 15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	Day 1	Day 8	Day 15	Day 1	Day 8	Day 15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						