

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PTX + CBDCA (PTX weekly)療法

4週毎 4コース予定

疾患名 非小細胞肺癌(non-small cell ca.)

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15
パクリタキセル	90 mg/m ²	↓	↓	↓
カルボプラチン	AUC 6	↓		

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、DHEP フリー点滴セットを使用すること

* アルコール過敏 有・無

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125mg) 1C を内服

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② レスタミン(10 mg) 5 錠 | 内服 |
| パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| デキサメタゾン 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ファモチジン 20 mg | 側管静注 |
| ☆30 分後より | |
| ③ パクリタキセル + 生食 500 mL | 点滴静注 90 分(360 mL/時間) |
| ④ カルボプラチン + 5 %ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注 60 分(280 mL/時間) |

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2, 3 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 1×朝 内服

Day 2-4 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

PTX+CBDCA (PTX weekly)療法

Day 8, 15

① 生食 500 mL で血管確保

維持(20 mL/時間)

② レスタミン(10 mg) 5 錠

内服

デキサメタゾン 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL

側管静注

ファモチジン 20 mg

側管静注

☆30 分の間隔をあける

③ パクリタキセル + 生食 500 mL

点滴静注 90 分(360 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						