

PEM 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PEM 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

ペムトレキセド	500mg/m ²	day1 ↓
---------	----------------------	-----------

【注意】

- * ペムトレキセド投与の 7 日以上前よりパンビタン末を 1g 分 1 で内服開始。^{注1}
- * ペムトレキセド投与の 7 日以上前より

メチコパール注 500 μ g 2A(1mg)を筋注(以後 9 週間毎)。^{注2}

注 1: 投与中止または終了する場合には、最終投与日から 22 日目まで可能な限り投与する
 注 2: 投与期間中及び投与中止後 22 日目まで 9 週ごと(3 コースごと)に 1 回投与する

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 100 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
 - ◎ 生食でフラッシュ
- ③ ペムトレキセド + 生食 100 mL 点滴 10 分 (600 mL/時間)
 - ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

PEM 療法