

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PEM+CBDCA 療法

3 週毎 3~6 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1
アリムタ(ペメトレキセド)	500 mg/m ²	↓
カルボプラチン	AUC 5 or 6	↓

- 【注意】 * ペメトレキセド投与の 7 日以上前よりパンピタン末を 1g 分 1 で内服開始。^{注1}
 * ペメトレキセド投与の 7 日以上前より

メチコパール注 500 μg 2A(1 mg)を筋注(以後 9 週間毎)。^{注2}

注 1: 投与中止または終了する場合には、最終投与日から 22 日目まで可能な限り投与する

注 2: 投与期間中及び投与中止後 22 日目まで 9 週ごと(3 コースごと)に 1 回投与する

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C を内服

- | | |
|--|--------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② アロキシ注 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン注 4.95 mg (1.5 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ④ アリムタ + 生食 100 mL | 点滴 10 分(600 mL/時間) |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴 60 分(280 mL/時間) |

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2, 3 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 1×朝 内服

Day 2-4 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

PEM+CBDCA 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アリムタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						