

ID

氏名

年齢

科名 病棟

DOC+CDDP+放射線療法
(short hydration)

6 週毎 1 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	・	・	day29	day36
ドセタキセル	40 mg/m ²	↓	↓			↓	↓
シスプラチン	40 mg/m ²	↓	↓			↓	↓
放射線	2 Gy/日 × 30回						

- 【注意】 *一日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること
- *シスプラチンは遮光のこと
- *治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液500 mLを1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1, 8, 29, 36

- ① 生食 500 mLで血管確保

維持(20mL/時間)
- ② 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注60分(500mL/時間)
- ③ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 100 mL

点滴静注30分(200mL/時間)
- ④ ドセタキセル + 5 %ブドウ糖 250 mL

点滴静注60分(250mL/時間)
- ⑤ 20 %マンニトール 200 mL

点滴静注30分(400mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 適量(全量500 mL)

点滴静注120分(240mL/時間)
- ⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注60分(500mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day2-4, 9-11, 30-32, 37-39 デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝昼 内服

	day1	day8	day29	day36
月日	/	/	/	/
ドセタキセル 開始時間	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時間	↓	↓	↓	↓
確認				