

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

6週毎 1コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	・	・	day29	day36
ドセタキセル	40 mg/m ²	↓	↓			↓	↓
シスプラチン	40 mg/m ²	↓	↓			↓	↓
放射線	2 Gy/日 × 30回						

【注意】*一日の尿量が 3000mL 以上になるように調整すること

*シスプラチンは遮光のこと

*治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液 500mL を 1日 2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1, 8, 29, 36 抗がん薬投与 1時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1Cap を内服

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
 - ② 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq 点滴静注 60分(500mL/時間)
 - ③ 生食 100mL + グラニセトロン注 3mg 1筒 + デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL) 点滴静注 30分(200mL/時間)
 - ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注 60分(250mL/時間)
 - ⑤ 20%マンニトール 200mL 点滴静注 30分(400mL/時間)
 - ⑥ シスプラチン + 生食 400mL 点滴静注 120分(240mL/時間)
- *生食 100mL をバッグから前もって抜いておく
- ⑦ 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq 点滴静注 60分(500mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

DOC+CDDP+放射線療法(short hydration)

Day2-3, 9-10, 30-31, 37-38

アプレピタントカプセル (80 mg) 1Cap 1×朝 内服

Day2-4, 9-11, 30-32, 37-39

デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼 内服

	day1	day8	day29	day36
月 日	/	/	/	/
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確 認				