

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

CPT11+CDDP療法 (short hydration)

4 週毎 コース予定

疾患名 小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	day15
イリノテカン	60 mg/m ²	↓	↓	↓
シスプラチン	60 mg/m ²	↓		

【注意】

* 必要時 化学療法開始前日から半夏瀉心湯7.5g 3×毎食前 内服開始
または 重曹 1.8g 3×毎食後 内服4日間

* イリノテカン使用前に腹痛・下痢がないことを確認する

* 一日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること

* シスプラチンは遮光のこと

* 治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq
点滴静注60分(500 mL/時間)
- ③ アロカリス 235mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 100 mL
点滴静注30分(200 mL/時間)
- ④ イリノテカン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注90分(180 mL/時間)
- ⑤ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注30分(400 mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注120分(250 mL/時間)

⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注60分(500 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝昼 内服

Day 8,15

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20 mL/時間)

② グラニセトロン 3 mg

側管静注

③ デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL

側管静注

④ イリノテカン + 5%ブドウ糖 250 mL

点滴静注90分(180 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 9,10,16,17 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝昼 内服

内服

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時間	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時間	↓			↓		
確認						