

ID

氏名

年齢

科名

病棟

GEM+CDDP療法 (short hydration)

3週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	day15
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	休
シスプラチン	80 mg/m ²	↓		

【注意】

* 一日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること

* シスプラチンは遮光のこと

* 治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20mL/時間)
- ② 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq 点滴静注60分(500mL/時間)
- ③ ゲムシタビン + 生食100 mL 点滴静注30分(200mL/時間)
- ④ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL 点滴静注30分(200mL/時間)
- ⑤ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注30分(400mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注120分(240mL/時間)
- ⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq 点滴静注60分(500mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝 昼

内服

Day 8

- ① 生食 500 mLで血管確保

維持(20mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg

側管静注
- ③ ゲムシタビン + 生食100 mL

点滴静注30分(200mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/		/	/	
ゲムシタビン 開始時間	↓	↓		↓	↓	
シスプラチン 開始時間	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/		/	/	
ゲムシタビン 開始時間	↓	↓		↓	↓	
シスプラチン 開始時間	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/		/	/	
ゲムシタビン 開始時間	↓	↓		↓	↓	
シスプラチン 開始時間	↓			↓		
確認						