

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

VNR(3投1休)+CDDP療法(short hydration)

週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌(non-small cell ca.)

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

	day1	day8	day15
ロゼウス(ビノレルピン) 25mg/m ²	↓		↓		↓
シスプラチン 80mg/m ²	↓				

【注意】*1日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること

*シスプラチンは遮光のこと

*治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液 500mL を1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1Cap を内服

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
- ② 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq
点滴静注 60分(500mL/時間)
- ③ ロゼウス + 生食 50mL
点滴静注 5分(全開実施)
ロゼウス終了後メインの生食 200 mL でルート内フラッシュ
- ④ 生食 100mL + グラニセトロン注 3mg + デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL)
点滴静注 30分(200mL/時間)
- ⑤ 20%マンニトール 200mL
点滴静注 30分(400mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 300mL
点滴静注 120分(240mL/時間)

*生食 200mL をバッグから前もって抜いておく

- ⑦ 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq
点滴静注 60分(500mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1Cap 1×朝 内服

day 2 - 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼 内服

day 8, 15

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
- ② ロゼウス + 生食 50mL 点滴静注 5分(全開実施)
- ◎ 終了後メインの生食 200mL でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						