

| | |
|----|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

VNR(2投1休)+CDDP療法 (short hydration)

週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

| | | day1 | day8 |
|--------------|----------------------|------|------|
| ロゼウス(ビノレルビン) | 25 mg/m ² | ↓ | ↓ |
| シスプラチン | 80 mg/m ² | ↓ | |

【注意】 *1日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること

*シスプラチンは遮光のこと

*治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液500 mLを1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20mL/時間)
- ② 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq 点滴静注60分(500mL/時間)
- ③ ロゼウス + 生食 50 mL 点滴静注5分(全開実施)
- ◎ ロゼウス終了後メインの生食 200 mLでルート内フラッシュ
- ④ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL 点滴静注30分(200mL/時間)
- ⑤ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注30分(400mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注120分(250mL/時間)
- ⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq 点滴静注60分(500mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2 - 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼

内服

day 8

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20mL/時間)
 - ② ロゼウス + 生食 50 mL 点滴静注5分(全開実施)
- ◎ 終了後メインの生食 200 mLでルート内フラッシュ



| | コース | | コース | | コース | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| | day1 | day8 | day1 | day8 | day1 | day8 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| ロゼウス 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| シスプラチン 開始時間 | ↓ | | ↓ | | ↓ | |
| 確認 | | | | | | |

| | コース | | コース | | コース | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| | day1 | day8 | day1 | day8 | day1 | day8 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| ロゼウス 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| シスプラチン 開始時間 | ↓ | | ↓ | | ↓ | |
| 確認 | | | | | | |

| | コース | | コース | | コース | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| | day1 | day8 | day1 | day8 | day1 | day8 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| ロゼウス 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| シスプラチン 開始時間 | ↓ | | ↓ | | ↓ | |
| 確認 | | | | | | |