

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

CDDP+S-1+放射線療法(short hydration)

4 週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day1	
シスプラチン	60mg/m ²	↓	
《内服》		day1	day14《14日間休薬》
エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル)		↓.....↓	
放射線		↓.....	

【注意】* シスプラチンは遮光のこと。

* 治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液 500mL を 1 日 2 本 飲水すること

エスワン

（体表面積に応じて下表により1日量を決定する。
1 日 2 回朝夕食後に分服し、Day1～14 の 2 週間投与する。）

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² 以上 ~ 1.5m ² 未満	100mg/day
1.5m ² 以上	120mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1Cap を内服

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
- ② 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq
点滴静注 60分(500mL/時間)
- ③ 生食 100mL + グラニセトロン注 3mg 1筒 + デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL)
点滴静注 30分(200mL/時間)
- ④ 20%マンニトール 200mL
点滴静注 30分(400mL/時間)
- ⑤ シスプラチン + 生食 350mL
点滴静注 120分(240mL/時間)

*生食 150mL をバッグから前もって抜いておく

CDDP+S-1+放射線療法(short hydration)

⑥ 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10mEq + 硫酸Mg補正液 4mEq

点滴静注 60分(500mL/時間)

day 2,3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1Cap 1×朝 内服
 day 2~4 デキサメタゾン錠 8 mg 内服
 day 1~14 エスワン 2×朝夕食後 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						