

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PEM + Bevacizumab 療法

## 3 週毎 4~6 コース予定

### 疾患名 非小細胞(非扁平上皮)肺癌

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

#### スケジュール

		day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	↓
ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓

【注意】\*ベバシズマブの点滴時間は初回投与時は 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行って良い。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でも良い。

\*ペムトレキセド投与の 7 日以上前よりパンビタン末を 1 g 分 1 で内服開始。<sup>注1</sup>

\*ペムトレキセド投与の 7 日以上前より

**メチコパール注 500 μg 2 A(1 mg)を筋注(以後 9 週間毎)。**<sup>注2</sup>

注 1: 投与中止または終了する場合には、最終投与日から 22 日目まで可能な限り投与する。

注 2: 投与期間中及び投与中止後 22 日目まで 9 週ごと(3 コースごと)に 1 回投与する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② ベバシズマブ + 生食 適量(全量 100 mL)       | 点滴静注(90~30 分)        |
| ③ デキサメタゾン 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注                 |
| ◎メインの生食でフラッシュ                     |                      |
| ⑤ ペムトレキセド + 生食 100 mL             | 点滴静注 10 分(600 mL/時間) |
| ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ             |                      |

PEM + Bevacizumab 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						