

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Weekly PTX【Alb 懸濁型】+ CBDCA+ 放射線療法

1週毎 1コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	8	15	22	29	36
アブラキサン(パクリタキセル【アルブミン懸濁型】)	40 or 50 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン	AUC 2	↓	↓	↓	↓	↓	↓
放射線療法 2 Gy/日×30日							

【注意】 * 投与時、インラインフィルターは使用しないこと。

* パクリタキセル【アルブミン懸濁型】は特定由来製品であるため同意を取得すること。

* 放射線療法終了4～8週間後に、PTX【Alb懸濁型】weekly + CBDCA療法を2コース施行する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 8, 15, 22, 29, 36

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注

③ アブラキサン + 生食 適量 点滴静注30分

アブラキサン1バイアルに対して生食20 mLで懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り、
空の点滴バック(残った生食はすべて抜き取る)に注入する。

◎ メインの生食でフラッシュ

④ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	day1	day8	day15	day22	day29	day36
月日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						