

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

**Weekly PTX【Alb 懸濁型】 + CBDCA**  
**+ 放射線療法**  
1 週毎 1 コース予定

**疾患名 非小細胞肺癌(non-small cell ca.)**

**主治医** \_\_\_\_\_ **指導医** \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

**スケジュール**

		day1	8	15	22	29	36
アブラキサン(パクリタキセル【アルブミン懸濁型】)	40 or 50 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン	AUC 2	↓	↓	↓	↓	↓	↓
-----							
放射線療法	2 Gy/日 × 30 日						

【注意】\* 投与時、インラインフィルターは使用しないこと。

\* パクリタキセル【アルブミン懸濁型】は特定由来製品であるため同意を取得すること。

\* 放射線療法終了 4~8 週間後に、PTX【Alb 懸濁型】weekly + CBDCA 療法を 2 コース施行する。

☆通常量より減量する際の理由☆

**(レジメン)**

day 1, 8, 15, 22, 29, 36

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3 mg 側管静注  
 デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL 側管静注  
 ◎メインの生食でフラッシュ
- ③ アブラキサン + 生食 適量 点滴静注 30 分  
 アブラキサン 1 バイアルに対して生食 20 mL で懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り、  
 空の点滴バック(残った生食はすべて抜き取る)に注入する。  
 ◎メインの生食でフラッシュ
- ④ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分(250 mL/時間)  
 ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Weekly PTX【Alb 懸濁型】 + CBDCA + 放射線療法

	1コース					
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36
月 日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						