

④ アブラキサン + 生食 適量 点滴静注30分

※アブラキサン1Vに対し生食20 mLで懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り

空の点滴バッグ(残った生食はすべて抜き取る)に注入する。

◎メインの生食でフラッシュ

⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2, 3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

Day 8, 15

① 生食 500mL で血管確保 維持(20 mL/時間)

② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注

◎メインの生食でフラッシュ

③ アブラキサン + 生食 適量 点滴静注30分

※アブラキサン1Vに対し生食20 mLで懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り

空の点滴バッグ(残った生食はすべて抜き取る)に注入する

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓			↓		
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

PTX [Alb懸濁型] weekly+CBDCA+Pembrolizumab療法

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓			↓		
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓			↓		
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						