



⑧ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注60分(500 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝昼 内服

Day 8

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20mL/時間)

② ポートラーザ 800 mg + 生食 200 mL

点滴静注60分(250 mL/時間)

※生食 50 mLをバッグから前もって抜いておく

◎メインの生食でルート内フラッシュ

③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL

側管静注

④ ゲムシタビン + 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	1コース		2コース	
	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/
ポートラーザ 開始時間	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時間	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時間	↓		↓	
確認				

	3コース		4コース	
	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/
ポートラーザ 開始時間	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時間	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時間	↓		↓	
確認				