

Erlotinib or Gefitinib +Ramucirumab 療法

2 週毎 PD まで

疾患名 非小細胞肺癌

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()

スケジュール

《注射》		day1
サイラムザ(ラムシルマブ)	10 mg/kg	↓

《内服》		
タルセバ(エルロチニブ)	150 mg/day	↓内服継続
or		
イレッサ(ゲフィチニブ)	250 mg/day	↓内服継続

- 【注意】* エルロチニブは食事の影響を受けるため食前 1 時間から食後 2 時間までの間の服用は避ける。
 * ラムシルマブの点滴時間は初回投与時 60 分かけて点滴静注、2 回目以降は忍容性が良好であれば、30 分投与でもよい。
 * インラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用する。
 * 定期的に蛋白尿の検査を実施する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② レスタミン(10 mg) 5 錠 内服
- ③ サイラムザ + 生食 250 mL 点滴静注(60~30 分)

day 1~継続内服 タルセバ 150 mg 1 日 1 回 内服
 or

day 1~継続内服 イレッサ 250 mg 1 日 1 回 内服

Erlotinib or Gefitinib +Ramucirumab 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
サイラムザ 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
サイラムザ 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
サイラムザ 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
サイラムザ 開始時刻						
確認						