

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Tremelimumab + Durvalumab 維持療法(A期)

8週毎 1コース予定

非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

	day1	day29
イジウド(トレメリブマブ)	75 mg/body	↓
イミフィンジ(デュルバルマブ)	1500 mg/body	↓

- 【注意】 *他剤併用時はデュルバルマブ、トレメリムマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること
 *デュルバルマブ、トレメリムマブはインラインフィルター(0.2または0.22 μm)を使用して投与すること
 *体重30kg以下の場合のデュルバルマブ1回投与量は20 mg/kgとして計算すること
 *1コース終了後、維持療法Bへ移行する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② イミフィンジ 1500 mg + 生食 70 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)
- ◎メインの生食でフラッシュ

day29

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② イジウド 75 mg + 生食 100 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)
- ◎メインの生食でフラッシュ
- ☆初回投与であれば60分間観察、2回目以降は省略可能
- ③ イミフィンジ 1500 mg + 生食 70 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)
- ◎メインの生食でフラッシュ

Tremelimumab+Durvalumabt維持療法(A期)

	1コース	
	day1	day29
月日	/	/
イジユド 開始時刻		↓
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓
確認		