

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Durvalumab+PEM維持療法(B期)

4週毎 PDまで非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

	day1
イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body	↓
ペムトレキセド 500mg/m ²	↓

- 【注意】 *他剤併用時はデュルバルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること
 *デュルバルマブはインラインフィルター(0.2または0.22 μ m)を使用して投与すること
 *体重30 kg以下の場合のデュルバルマブ1回投与量は20 mg/kg(体重)として計算すること
 *ペムトレキセド投与の7日以上前よりパンピタン末を1 g分1で内服開始。^{注1}
 *ペムトレキセド投与の7日以上前より

メチコパール中500 μ g 2A(1 mg)を筋注(以後9週間毎)。^{注2}

注1:投与中止または終了する場合には、最終投与日から22日まで可能な限り投与する。

注1:投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② イミフィンジ 1500 mg + 生食 70 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)
- ◎メインの生食でフラッシュ
- ☆初回は60分間観察、2回目以降は30分に短縮可能
- ④ デキサメタゾン注6.6 mg(2mL)+生食 20 mL 側管静注
- ◎メインの生食でフラッシュ
- ⑤ ペムトレキセド + 生食 100 mL 点滴静注10分(600 mL/時間)
- ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース day1	コース day1	コース day1	コース day1
月日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ペムトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				