

| | |
|----|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

【術前】

Nivolumab+PTX+CBDCA療法

3週毎 3コース予定

非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

| | | day1 |
|--------------|-----------------------|------|
| オプジーボ(ニボルマブ) | 360 mg/body | ↓ |
| パクリタキセル | 200 mg/m ² | ↓ |
| カルボプラチン | AUC 6 | ↓ |

【注意】 *他剤使用時は、ニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

*ニボルマブは、0.2 又は 0.22 μ mインラインフィルターを通して投与すること。

*パクリタキセルは、0.2 又は 0.22 μ mインラインフィルターを使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること

*アルコール過敏 有・無

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1 Cap 内服

- ① 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② オプジーボ 360 mg + 生食 64 mL 点滴静注30分(200 mL/時間)
◎メインの生食でフラッシュ
- ③ レスタミン(10 mg) 5 錠 内服
- ④ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL)+ 生食 20 mL
側管静注
- ⑤ ファモチジン 20 mg 側管静注

☆ 30 分後より

- ⑥ パクリタキセル + 生食 500 mL 点滴静注180分(180 mL/時間)
- ⑦ カルボプラチン + 5 %ブドウ糖液 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 アプレピタントカプセル(80 mg) 1 Cap 1 ×朝 内服

day 2 - 4 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

| | 1 コース | 2 コース | 3 コース |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 月 日 | / | / | / |
| オプジーボ 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ |
| パクリタキセル 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ |
| カルボプラチン 開始時間 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 確認 | | | |