

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PEM+Osimertinib療法

3 週毎      コース予定

疾患名      非小細胞肺癌

主治医      指導医      HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )  
スケジュール

《注射》		day 1
ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓
-----		
《内服》		
タグリッソ(オシメルチニブ)	80 mg/day	↓ ..... 内服継続

【注意】 \* ペムトレキセド投与の7日以上前よりパンピタン末を1g 分1で内服開始<sup>(注1)</sup>

\* ペムトレキセド投与の7日以上前より

メチコバル注500 μg 2A(1mg)を筋注(以後9週間毎)<sup>(注2)</sup>

注1:投与中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する

注2:投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 100 mLで血管確保      維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL      側管静注
  - ◎ 生食でフラッシュ
- ③ ペムトレキセド      + 生食 100 mL      点滴静注 10分 (600 mL/時間)
  - ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day 1～継続内服

タグリッソ      1日1回      内服

PEM+Osimertinib療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペムレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						