

ID

氏名

年齢

科名

病棟

PEM+CBDCA+Amivantamab療法(80 kg以上)

3 週毎 4 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

【1コース目】

		day1	day2	day8	day15
ライブリバント(アミバンタマブ)	350 mg/body	↓			
	1400 mg/body		↓		
	1750 mg/body			↓	↓
ペメトレキセド	500 mg/m ²	↓			
カルボプラチン	AUC 5	↓			

【2コース目】

		day1
ライブリバント(アミバンタマブ)	1750 mg/body	↓
ペメトレキセド	500 mg/m ²	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓

【3・4コース目】

		day1
ライブリバント(アミバンタマブ)	2100 mg/body	↓
ペメトレキセド	500 mg/m ²	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓

- 【注意】
- * アミバンタマブは0.2または0.22 μmインラインフィルターを通して投与すること
 - * アミバンタマブは調製後10時間以内に投与終了すること
 - * ペメトレキセド投与の7日以上前よりパンビタン末を1g 分1で内服開始^注
 - * ペメトレキセド投与の7日以上前より

メチコパール^注500 μg 2A(1mg)を筋注(以後9週間毎)

注:ペメトレキセド最終投与日から22日目まで可能な限り投与する

通常量より減量する際の理由

【1コース目】

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服
- ③ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 100 mL
点滴静注30分(200 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

- ④ ペメトレキセド + 生食 100 mL 点滴静注10分(600 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

- ⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

- ⑥ ライブリバント 350 mg + 生食 243 mL(全量 250 mL) 点滴静注240分

◎輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注

- ⑦ 50 mL/時間で120分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて 75 mL/時間 で点滴静注

Day 2

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服
- ③ デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注

☆45分以上あけて

④ ライブリバント 1400 mg + 生食 222 mL(全量 250 mL) 点滴静注360分

◎輸液ポンプにて 25 mL/時間 で点滴静注

⑤ 33 mL/時間で120分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注

Day 3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

Day 8

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

☆30分以上あけて

③ ライブリバント 1750 mg + 生食 215 mL(全量 250 mL) 点滴静注240分

◎輸液ポンプにて 65 mL/時間 で点滴静注

Day 15

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

☆30分以上あけて

③ ライブリバント 1750 mg + 生食 215 mL(全量 250 mL) 点滴静注180分

◎輸液ポンプにて 85 mL/時間 で点滴静注

【2コース目】

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

③ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

④ ペメトレキセド + 生食 100 mL

点滴静注10分(600 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL

点滴静注60分(280 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

⑥ ライブリバント 1750 mg + 生食 215 mL(全量 250 mL)

点滴静注120分

◎輸液ポンプにて 125 mL/時間 で点滴静注

Day 2-3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

【3・4コース目】

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠

内服

③ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

④ ペメトレキセド + 生食 100 mL

点滴静注10分(600 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

⑤ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL

点滴静注60分(280 mL/時間)

◎メインの生食でフラッシュ

⑥ ライブリバント 2100 mg + 生食 208 mL(全量 250 mL)

点滴静注120分

◎輸液ポンプにて 125 mL/時間 で点滴静注

Day 2-3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	1コース目				2コース目	3コース目	4コース目
	day1	day2	day8	day15	day1	day1	day1
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキセド 開始時刻	↓				↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓				↓	↓	↓
確認							