

ID

氏名

年齢

科名

病棟

PEM+Amivantamab療法

3 週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day1
ライブリバント(アミバンタマブ)	1750 mg/body (80 kg未満)	↓
	2100 mg/body (80 kg以上)	↓
ペトレキセド	500 mg/m ²	↓

【注意】 * アミバンタマブは0.2または0.22 μ mインラインフィルターを通して投与すること

* アミバンタマブは調製後10時間以内に投与終了すること

* ペトレキセド投与の7日以上前よりパンビタン末を1g 分1で内服開始^注

* ペトレキセド投与の7日以上前より

メチコバル注500 μ g 2A(1mg)を筋注(以後9週間毎)^注

注:ペトレキセド最終投与日から22日目まで可能な限り投与する

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 | 内服 |
| ☆30分以上あけて | |
| ③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ④ ペトレキセド + 生食 100 mL | 点滴静注10分(600 mL/時間) |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ⑤ ライブリバント + 生食 適量(全量 250 mL) | 点滴静注120分 |

◎輸液ポンプにて 125 mL/時間 で点滴静注

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日付	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ペメトレキシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							