

ID

氏名

年齢

科名

病棟

PTX + CBDCA + Cemiplimab 療法

3週毎 4 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

day 1

リブタヨ(セミプリマブ)	350 mg/body	↓
パクリタキセル	200 mg/m ²	↓
カルボプラチナ・	AUC 5 or 6	↓

【注意】 * 他剤使用時はセミプリマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

* セミプリマブ投与時はインラインフィルター(0.2~5 μm)を通して投与すること。

* パクリタキセルは0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること

* アルコール過敏 有・無

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

① 生食 500 mL 維持(20 mL/時間)

② リブタヨ 350 mg + 生食 50 mL 点滴静注30分

◎メインの生食でフラッシュ

③ レスタミン錠 10 mg 5錠 内服

④ フアモチジン 20 mg + デキサメタゾン 16.5 mg 側管静注

⑤ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + 生食 100 mL
点滴静注30分(200 mL/時間)

⑥ パクリタキセル + 生食 500 mL 点滴静注180分(180 mL/時間)

PTX+CBDCA+Cemiplimab療法

⑦ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 2-3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	1 コース	2 コース	3 コース	4 コース
月 日	/	/	/	/
リブタヨ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				