

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PEM+CBDCA療法

3 週毎 6 コース予定

疾患名 悪性胸膜中皮腫

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day 1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓

【注意】 *ペムトレキセド投与の7日以上前よりパンビタン末を1g 分1で内服開始(注1)

*ペムトレキセド投与の7日以上前より

メチコバル注500 μg 2A(1mg)を筋注(以後9週間毎)(注2)

注1:投与中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する

注2:投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + 生食 100 mL
 - ◎ メインの生食でフラッシュ 点滴静注30分(200 mL/時間)
- ③ ペムトレキセド + 生食 100 mL 点滴静注10分(600 mL/時間)
 - ◎ メインの生食でフラッシュ
- ④ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)
 - ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

Day 2-4 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

PEM+CBDCA療法

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース
月日	/	/	/	/	/	/
ペメトレキセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						