

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab(3 週毎) +Ipilimumab 療法

6 週毎 コース予定

疾患名 悪性胸膜中皮腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()
スケジュール

		day1	day22
オプジーボ(ニボルマブ)	360 mg/body	↓	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	1 mg/kg	↓	

【注意】*他剤使用時は、ニボルマブおよびイピリムマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

*0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- | | |
|--|----------------------|
| ① 生食 250 mL で血管確保 | 維持 |
| ② オプジーボ 360 mg + 生食 64 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ◎30 分間あけて | |
| ③ ヤーボイ + 生食 適量(全量 50 mL) | 点滴静注 30 分 |
| (投与量が 50 mg 未満の場合は 1 mg/mL になるよう生食液量を調節する) | |
| ◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針 | |

day 22

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ① 生食 250 mL で血管確保 | 維持 |
| ② オプジーボ 360 mg + 生食 64 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

Nivolumab(3週毎)+Ipilimumab 療法

	コース		コース	
	day1	day22	day1	day22
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓		↓	
確 認				

	コース		コース	
	day1	day22	day1	day22
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓		↓	
確 認				

	コース		コース	
	day1	day22	day1	day22
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓		↓	
確 認				

	コース		コース	
	day1	day22	day1	day22
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓		↓	
確 認				