

疾患名 悪性胸膜中皮腫

主治医	指導医
-----	-----

スケジュール

キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200 mg/body	day1 ↓
------------------	-------------	-----------

- * 他剤使用時はペムブロリズマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること
- * ペムブロリズマブはインラインフィルター(0.2または0.22 μ m)を通して投与すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ① 生食 250 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② キイトルーダ® 200 mg + 生食 50 mL | 点滴静注30分(100 mL/時間) |

(希釈後最終濃度が1～10 mg/mLとなるよう生食液量を調節する)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認							

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認							

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認							