

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Neoadjuvant or Adjuvant
TC療法

3週毎 術前 4 コース予定
術後 4 ～ 8 コース予定

疾患名 術前・術後乳癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()
スケジュール

		day1
エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m ²	↓
ドセタキセル	75 mg/m ²	↓

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン 3 mg | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ エンドキサン + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ⑤ ドセタキセル + 5%ブドウ糖 250 mL | 点滴静注60分(250 mL/時間) |
| ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針 | |
| ⑥ ジーラスタボディーポッド 3.6 mg | 皮下注 |

Day 2- 3 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					