

ID	
氏名	
年齢	病棟
科名	

# Neoadjuvant or Adjuvant TC 療法

## 3 週毎

術前 4 コース予定 / 術後 4~8 コース予定

疾患名 術前・術後 乳癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

### スケジュール

		day1
エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m <sup>2</sup>	↓
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	↓

☆通常量より減量する際の理由☆

### (レジメン)

#### day1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 側管静注
- ③ デキサメタゾン注 6.6 mg (2mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ④ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注 30 分 (200 mL/時間)
- ⑤ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分 (250 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day 2- 3 デキサメタゾン錠 4 mg/日 内服

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

Neoadjuvant or Adjuvant TC 療法

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					