

AC療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

AC療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day 1
ドキソルビシン	60 mg/m ²	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m ²	↓

【注意】 * ドキソルビシンの総投与量は 500mg/m²を超えないこと。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1Cを内服

- ① ソリタT3 200 mLにて血管確保
- ② グラニセトロン注 3mg 1筒 ゆっくり静注
- ③ デキサメタゾン注9.9 mg (3mL) + 生食 20 mL ゆっくり静注
- ④ ドキソルビシン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ⑤ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注60分

◎ 血管確保していたソリタT3をエンドキサンと同時滴下し、90分で点滴

- ⑥ オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌)

day 2、3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2-4 オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌)

デキサメタゾン 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

AC療法

コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						