

## AC 療法

ID

氏名

年齢

科名

病棟

## AC 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

		day 1
ドキソルビン	60 mg/m <sup>2</sup>	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	600mg/m <sup>2</sup>	↓

【注意】 \*ドキソルビシンの総投与量は 500mg/m<sup>2</sup> を超えないこと。

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

## day1

抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1C を内服

- ① ソリタ T3 200 mL にて血管確保
- ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 ゆっくり静注
- ③ デキサメタゾン注 9.9 mg (3mL) + 生食 20 mL ゆっくり静注
- ④ ドキソルビン + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)
- ⑤ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注 60 分

◎血管確保していたソリタ T3 をエンドキサンと同時滴下し、90 分で点滴

day 2、3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2-4 デキサメタゾン錠 8mg 2×朝、昼 内服

コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

