

CMF療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

4 週毎 _____コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day 8
フルオロウラシル	500 mg/m ²	↓	↓
メソトレキセート(メトトレキサート)	40 mg/m ²	↓	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	1000 mg/m ²	↓	

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- ① グラニセトロン内服ゼリー (2mg) 1包 内服
- ② ソリタ T3 200mL にて血管確保
- ③ デキサメタゾン注 9.9 mg (3mL) + 生食 20mL 側管静注
- ④ メソトレキセート + 生食 50mL 点滴静注 5分(600 mL/時間)
- ⑤ フルオロウラシル + 生食 50mL 点滴静注 5分(600 mL/時間)
- ⑥ エンドキサン + 生食 100mL 点滴静注 60分
- ⑦ 血管確保していたソリタ T3 200mL をエンドキサンと同時滴下 90分で点滴静注

Day 2, 3

デキサメタゾン錠 8mg 1×朝 内服

Day 8

- ① グラニセトロン内服ゼリー (2mg) 1包 内服
- ② ソリタ T3 200mL にて血管確保
- ③ デキサメタゾン注 9.9mg (3mL) + 生食 20m 側管静注

CMF 療法

- ④ メソトレキセート + 生食 50mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)
 ⑤ フルオロウラシル + 生食 50mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)

Day 9, 10

デキサメタゾン錠 8mg 1×朝 内服

	コース		コース	
	Day 1	Day 8	Day 1	Day 8
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時間	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓		↓	
施行者署名				
	コース		コース	
	Day 1	Day 8	Day 1	Day 8
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時間	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓		↓	
施行者署名				
	コース		コース	
	Day 1	Day 8	Day 1	Day 8
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時間	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓		↓	
施行者署名				