ID
氏名
年齢
科名　　病棟

PTX[Alb 懸濁型] 療法

3 週毎　　コース予定

疾患名　　乳癌

主治医　　**指導医**　　HBs 抗原(＋ －) HBc 抗体(＋ －) HCV 抗体(＋ －)

スケジュール

	day1
アブラキサン[パクリタキセル(アルブミン懸濁型)]　260 mg/m^2	↓

【注意】 ＊ 投与時、インラインフィルターは使用しないこと。
＊ パクリタキセル(アルブミン懸濁型)は特定生物由来製品であるため同意を取得すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

① 生食 500 mL で血管確保　　維持(20 mL/時間)

② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) ＋ 生食 20 mL　　側管静注

◎メインの生食でフラッシュ

③ アブラキサン　　＋ 生食 100 mL　　点滴静注 30 分

＊ アブラキサン 1 バイアルに対し生食 20 mL で懸濁後(5 mg/mL)、必要量抜き取り、空の点滴バック(残った生食はすべて抜き取る)に注入する。

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	／	／	／	／	／	／
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						