

ID
氏名
年齢
科名

病棟

DOC+[BS]Trastuzumab tri-weekly 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day 1
トラスツズマブ BS	初回投与 8 mg/kg(90 分以上で)	↓
	2 回目以降 6 mg/kg(30 分以上で)	
ドセタキセル	75 mg/m ²	↓

【注意】 * トラスツズマブは投与予定日より 1 週間以内の遅れで投与する際は 6 mg/kg を投与する。

* トラスツズマブは投与予定日より 1 週間を越えた後に投与する際は、改めて初回投与量の 8 mg/kg で投与を行う。なお、次回以降は 6 mg/kg を 3 週間間隔で投与する。

* トラスツズマブは初回投与时 90 分以上かけて、初回投与の忍容性が良好であれば 2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

< 初回投与 >

day 1

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持 (20 mL/時間) |
| ② トラスツズマブ BS + 生食 250 mL | 点滴静注 90 分 |
| ③ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注 60 分 (250 mL/時間) |
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg /日 内服

< 2回目以降 >

day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)
 - ② トラスツズマブ BS + 生食 250 mL 点滴静注 (____)分
 - ③ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 m 側管静注
 - ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分 (250 mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg /日 内服

	コース							
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トラスツズマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								