

ID

氏名

年齢

科名

病棟

## PTX + Bevacizumab 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医

指導医

HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

## スケジュール

		day1	day8	day15
アバスチン(ベバシズマブ)	10mg/kg	↓		↓
パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓

【注意】 \*パクリタキセルはインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、

DHEP フリー点滴セットを使用すること

\* アルコール過敏 有 ・ 無

\*ベバシズマブの点滴時間は初回投与時は 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行ってよい。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でもよい。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1・15

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ① 生食 500mL にて血管確保                 | 維持(20mL/時間)  |
| ② アバスチン + 生食 適量 (全量 100mL)        | 点滴静注(90~30分) |
| ③ レスタミン(10 mg) 5錠 内服              |              |
| ファモチジン注 20 mg                     | 側管静注         |
| デキサメタゾン注 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注         |

☆ 30分後より

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ④ パクリタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注 60分(250mL/時間) |
|----------------------------|--------------------|

PTX+Bevacizumab 療法

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day8

① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)

② レスタミン(10 mg) 5 錠 内服

ファモチジン注 20 mg

側管静注

デキサメタゾン注 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL

側管静注

★ 30 分後より

③ パクリタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分(250 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
アバスチン 開始時刻	↓		↓	↓		↓
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
アバスチン 開始時刻	↓		↓	↓		↓
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						