

カドサイラ療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

カドサイラ療法 (Trastuzumab - DM1)

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

カドサイラ(トラスツズマブ エムタンシン) 3.6mg/kg	day1 ↓
--------------------------------	-----------

【注意】* 初回投与は 90 分かけて点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、
2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる。

* 0.2 又は 0.22 μm インラインフィルター(ポリエーテルスルホン製)を通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

< 初回投与 >

- ① 生食 250mL で血管確保
- ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20mL 側管静注
- ③ カドサイラ + 生食 250mL 点滴静注 90 分

< 2回目以降 >

- ① 生食 250mL で血管確保
- ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20mL 側管静注
- ③ カドサイラ + 生食 250mL 点滴静注 ()分

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
カドサイラ 開始時刻								
確認								