

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# dose dense AC 療法

2 週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

		day 1
ドキソルビン	60 mg/m <sup>2</sup>	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	600mg/m <sup>2</sup>	↓

【注意】 \*ドキソルビンの総投与量は 500mg/m<sup>2</sup> を超えないこと。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

### day1

抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1C を内服

- ① YD ソリタ T3 200 mL にて血管確保
- ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 ゆっくり静注
- ③ デキサメタゾン注 9.9 mg (3mL) + 生食 20 mL ゆっくり静注
- ④ ドキソルビン + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)
- ⑤ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注 60 分(100mL/時間)

◎血管確保していた YD ソリタ T3 をエンドキサンと同時滴下し、90 分で点滴

day 2 もしくは 3 ジーラスタ皮下注 3.6mg 皮下注

day 2、3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2-4 デキサメタゾン錠 8mg 2×朝、昼 内服

コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ドキソルビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						