

Pertuzumab+【BS】Trastuzumab tri - weekly 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1
パージェタ(ペルツズマブ)	【初回投与】 840 mg/body	↓
	【2 回目以降】 420 mg/body	
トラスツズマブ BS	【初回投与】 8 mg/kg	↓
	【2 回目以降】 6 mg/kg	

【注意】*トラスツズマブは投与予定日より 1 週間を越えた後に投与する際、改めて初回投与量の 8 mg/kg で投与を行う。なお、次回以降は 6 mg/kg を 3 週間間隔で投与する。

*トラスツズマブは初回投与時 90 分以上かけて、初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降(トラスツズマブ既接種者も含めて)の投与時間は 30 分間まで短縮できる。

*ペルツズマブは投与予定日より 3 週間以上後(前回投与日から 6 週間以上後)に投与する際、改めて初回投与量の 840 mg で投与を行う。なお、次回以降は 420 mg を 3 週間間隔で投与する。

*ペルツズマブは初回投与時 60 分かけて、初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パージェタ + 生食 250 mL | 点滴静注 |
| 【840 mg 投与時】 60 分以上 | |
| 【420 mg 投与時】 30 分以上 | |
| ③ トラスツズマブ BS + 生食 250 mL | 点滴静注 |
| 【8 mg/kg 投与時: mg】 90 分以上 | |
| 【6 mg/kg 投与時: mg】 30 分以上 | |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Pertuzumab + 【BS】Trastuzumab tri-weekly 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								