ID

氏名

年齢

科名　　病棟

dose dense EC 療法

2週毎　　コース予定

疾患名　乳癌

主治医　　指導医

HBs抗原(　)、HBs抗体(　)、HBc抗体(　)

スケジュール

		day1
エピルビシン	90 mg/m^2	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m^2	↓

【注意】＊エピルビシンの総投与量は900 mg/m^2を超えないこと。

通常量より減量する際の理由

（レジメン）

Day 1

① 生食 500 mLで血管確保　　維持(20 mL/時間)

② アロカリス 235 mg ＋ パロノセトロン 0.75 mg ＋ デキサメタゾン 9.9 mg ＋ 生食 100 mL

点滴静注30分

③ エピルビシン　＋ 生食 50 mL　　点滴静注5分(600 mL/時間)

④ エンドキサン　＋ 生食 100 mL　　点滴静注60分(100 mL/時間)

⑤ ジーラスタボディーポッド 3.6 mg　　皮下注

Day 2-4　デキサメタゾン錠　8 mg　2×朝昼　内服

	コース目	コース目	コース目	コース目
月　日	/	/	/	/
エピルビシン開始時刻	↓	↓	↓	↓
エンドキサン開始時刻	↓	↓	↓	↓
確　認				

福岡大学化学療法プロトコール審査委員会承認（2023年6月17日）A0346
2024年9月27日改訂