Trastuzun	nab Deruxtecan 療法									
ID		Trastuzumab Deruxtecan								
氏名										
年齢		3週毎 コース予定								
科名	病棟	<u>乳がん</u>								
主治医	指導医	HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )								
スケジュー	ール									
	day1									
エンハー	ソ(トラスツズマブ デルクステカン)	5.4 mg/kg ↓								
【注意】	*初回投与は90分かけて点滴 時間は30分間まで短縮できる。	静注する。初回の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与								
	*インラインフィルター(0.2 μm)を使用すること。									
	*投与開始前にCT、問診、間質性肺炎マーカー検査等を実施し、間質性肺炎の合併または									
	既往歴がないことを確認したうえで、投与の可否を慎重に判断すること。									
	*間質性肺疾患の早期発見のため、投与中は、臨床症状確認、SPO2の測定、胸部X線、CT、									
間質性肺炎マーカー等の検査を行うこと。										
通常量より減量する際の理由										
(レジメン	<b>,</b> )									
day 1										
1	- 5%ブドウ糖 500 mLで血管	確保維持								
<b>②</b>	パロノセトロン 0.75 mg + デキサ	メタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 5%ブドウ糖 100 ml								

点滴静注 30分

+ 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL 点滴静注 90~30分 3

day2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝昼 内服

	コース							
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
エンハ <b>ー</b> ツ 開始時間	1	1	1	1	1	1	1	1
確認								