

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 8, 15, 29, 36, 57, 64, 71

- ① 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注

◎メインの生食でフラッシュ

- ③ アブラキサン + 生食 50 mL 点滴静注30分

- * アブラキサンはインラインフィルターを使用しないこと
- * アブラキサン1バイアルに対し生食20 mLで懸濁後(5 mg/mL)、必要量抜き取り、空の点滴バック(残った生食はすべて抜き取る)に注入する。

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース		
	day1	day8	day15
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓		
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			
	day29	day36	day43
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻			↓
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			
	day57	day64	day71
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻			
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			

	コース		
	day1	day8	day15
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓		
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			
	day29	day36	day43
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻			↓
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			
	day57	day64	day71
月日	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻			
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			