

Pembrolizumab+PTX+CBDCA 療法

- ⑥ デキサメタゾン4.95 mg + 生食20 mL 側管静注
☆30分後より
- ⑦ パクリタキセル + 5%ブドウ糖250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)
- ⑧ カルボプラチン + 5%ブドウ糖250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 2,3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 内服

デキサメタゾン錠 4 mg 内服

day 8, 15

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② レスタミン10 mg 5錠 内服
- ④ ファモチジン20 mg 側管静注
- ⑤ デキサメタゾン6.6 mg + 生食20 mL 側管静注
☆30分後より
- ⑥ パクリタキセル + 5%ブドウ糖250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓			↓		
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓			↓		
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓			↓		
確認						