ID

氏名

年齢

科名　　病棟

フェスゴ配合皮下注療法

3 週毎　　コース予定

疾患名　乳癌

主治医　　指導医

HBs抗原(　　)、HBs抗体(　　)、HBc抗体(　　)

スケジュール

				day1
フェスゴ	初回投与	フェスゴ IN	(8分以上かけて)	↓
	2回目以降	フェスゴ MA	(5分以上かけて)	

【注意】＊　大腿部に投与をすること、また前回の注射部位から2.5cm以上離すこと

＊　前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する

☆通常より減量する際の理由☆

（レジメン）

day 1

① フェスゴ　　皮下注

初回用量(フェスゴ IN)投与の場合は、8分以上かけて大腿部に皮下投与

維持用量(フェスゴ MA)投与の場合は、5分以上かけて大腿部に皮下投与

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					