

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

フェスゴ配合皮下注療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

フェスゴ	初回投与	フェスゴ IN	(8分以上かけて)	day1
	2回目以降	フェスゴ MA	(5分以上かけて)	↓

【注意】 * 大腿部以外への投与は避け、前回の注射部位から2.5cm以上離すこと

* 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する

☆通常より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

フェスゴ 皮下注

初回用量(フェスゴ IN)投与の場合は 8分以上かけて大腿部に皮下投与

維持用量(フェスゴ MA)投与の場合は 5分以上かけて大腿部に皮下投与

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				